

Spécial pois chiche

Etat des cultures

Les parcelles de pois chiche du Sud de la France sont actuellement en floraison. Les stades s'étalent de début floraison à remplissage des graines.

L'état sanitaire est globalement correct. Cependant, on note des symptômes d'ascochytose peu intenses mais fréquents cette année. Les températures élevées des derniers jours ont stoppé les nouvelles contaminations. Toutefois, il convient d'être prudent jusqu'à la fin floraison.

Gestion de l'héliothis

L'apparition des gousses et des premières graines est le signal pour commencer l'observation du ravageur.

L'héliothis ou noctuelle de la tomate, touche de nombreuses espèces cultivées et peut être très préjudiciable à la culture s'il n'est pas détecté en amont. En effet, les larves s'alimentent des grains en formation. Le suivi du ravageur passe par le piégeage des papillons mâles. La cible de la protection vise les larves et les meilleures efficacités sont observées sur les stades les plus jeunes, appelé L1 et L2. Le positionnement de la protection détermine donc sa réussite. Aujourd'hui, parmi les spécialités commerciales disponibles, les produits de biocontrôles montrent des efficacités tout à fait acceptables. Parmi eux, on citera le Dipel DF et l'Helicovex.

Les spécialités commerciales à base de pyréthri-noïdes autorisés sont à éviter, surtout lors des premières applications. En effet les populations d'héliothis sont généralement résistantes aux pyréthri-noïdes et l'efficacité du passage sera décevante. De plus, en procédant ainsi, on accélère la pression de sélection en sélectionnant les individus déjà résistants.

Le déclenchement d'une éventuelle protection doit se faire en prenant en compte les piégeages de papillons via le suivi d'un piège à la parcelle ou du réseau de piégeage régional organisé dans le cadre du BSV. Le stade doit également être pris en compte dans la réflexion, en effet, c'est lorsque les gousses sont formées que les dégâts potentiels seront les plus élevés.

Il semblerait qu'un pic de vol ait été observé la semaine dernière. Des protections ont eu lieu. Cette semaine, les piégeages sont moins importants. Attention, il est possible que l'on observe de nouvelles captures en nombre dans les prochaines semaines à la faveur d'un temps chaud et sec.

Voir le BSV Arc Méditerranéen Pois Chiche

Voir article Terres Inovia :

https://www.terresinovia.fr/-/heliothis-ou-noctuelle-de-la-tomate-pois-chiche?p_r_p_categoryId=130499&p_r_p_tag=40916&p_r_p_tags=360878

Quentin LAMBERT

Animateur technique national pois chiche, Terres Inovia

- Arterris, Comptoir Agricole du Languedoc, Ets Magne, Arterris, Coop. d'Alès, Terroirs du sud, Coop. de St Etienne du Grès, Groupe Provence Services, Ets Garcin.
- CAPL, Ets Perret, Ets Touchat, Ets Peris, Semences de Provence, Actisem, Semences de France, JEEM, SCAD, Ets Vernazobres
- Chambres d'Agriculture 11, 13, 30, 34
- BRL, SCP, Lycées agricoles d'Aix Valabre et Nîmes Rodilhan