

Campagne 2025-2026 n°09 – 23 mars 2026

Interventions à prévoir

• Désherbage on en est où ?

Partout dans la Région, de Narbonne jusqu'à la Provence, des levées massives de dicotylédones sont observées. Parmi elles, les chardons des champs sont particulièrement nombreux.

Les conditions météorologiques à venir ne sont pas particulièrement favorables à une intervention (vent), mais il faut se tenir prêt dès qu'un créneau permettra une intervention.

Le **Tableau 1** ci-dessous indique des exemples de spécialités efficaces en fonction de la flore présente.

Dans la Région la plupart des blés ont atteint le stade épi 1 cm et sont très majoritairement entre 1 nœud, pour les moins avancés, à 2 nœuds.

Rappel 1 : éviter les interventions dans les situations suivantes :

- Fortes amplitudes thermiques (attention au coup de froid annoncé dans les prochains jours).
- Plante cultivée chétive, stressée.
- Trop forte rosée (qui fait couler l'herbicide pour les herbicides à pénétration foliaire). Si les gouttes restent sur le feuillage (petite rosée) c'est parfait.
- Vents forts.

Rappel 2 : attention aux phytotoxicités des sulfonylurées sur les cultures suivantes

- Sur des blés suivis de colza sans possibilité de labour, éviter d'utiliser ces produits (de même s'il y a des cultures maraichères sensibles l'année suivante).
- Toutes les sulfonylurées n'ont pas la même rémanence : un pyroxulame ou un amidosulfuron par exemple sont assez peu rémanents et présentent peu de risques pour la culture suivante, y compris en non-labour. En revanche, un sulfosulfuron, mésosulfuron, propoxycarbazone, voire le metsulfuron, sont plus à risques. Les conditions sèches de fin de cycle accentuent d'autant plus le risque de rémanence.
- Rinçage et nettoyage du pulvérisateur après utilisation d'une sulfonylurée : après utilisation, réaliser un rinçage efficace du pulvérisateur avec un produit nettoyant adapté aux sulfonylurées pour éviter les accidents de phytotoxicité sur les autres cultures.

Rappel 3 : Attention à l'utilisation de certaines hormones (notamment 2.4D) : peut engendrer des pertes notamment sur verger. En présence de cultures à risques, **on évite les hormones formulées en ester**, en désherbage tardif.

Tableau 1 : liste de spécialités (liste non exhaustives) efficaces sur différentes dicotylédones présentes en région Méditerranéenne

Situation type / flore dominante	Blé stade Tallage	Blé Epi 1 cm	Blé 1-2 nœuds
Véroniques	ALLIÉ EXPRESS 40 à 50g ou PICOSOLO à 100 g/ha		
Ombellifères, géranium, anthémis, matricaires, crucifères	Nombreuses spécialités à base de metsulfuron-méthyl 20-25 g		
Gaillet, Stellaire	Nombreuses spécialités à base de florasulam solo ou PRIMUS wg 25g ou CANOPIA 70g ou SYNOPSIS 35g ou ZYPAR 0.75 à 1L ou PIXXARO EC 0.3 à 0.5L ou PROVALIA LQM 1L ou SEKENS 1L		
Coquelicot non résistant aux inhibiteurs de l'ALS et/ou forte infestation	Nombreuses spécialités de metsulfuron-méthyl 20-25 g (ALLIÉ EXPRESS 40 à 50 g ou ALLIÉ STAR SX 40 à 50 g ou ALLIANCE WG 75 g ou CANOPIA 70g ...) ou ZYPAR 0.75L ou PIXXARO EC 0.3 à 0.5L		
Coquelicot résistant aux inhibiteurs de l'ALS et/ou forte infestation	ZYPAR 0.75L ou PIXXARO EC 0.3 à 0.5L		
Chardons des champs	CHARDEX/ EFFIGO 1.5 L/ha à 2L/ha ou CHARDOL 600 à 1.25 L/ha ou LONPAR 2L/ha		
Chardons marie	LONPAR 2L/ha (le plus efficace) ou CHARDEX/ EFFIGO 1.5 L/ha à 2L/ha ou CHARDOL 600 à 1.25 L/ha		

• Maladies : attention à la septoriose

En parallèle, de la **septoriose est présente de partout**, et commence à remonter, en particulier sur les blés les plus avancés à 2 nœuds. Des symptômes sont déjà visibles sur les étages foliaires supérieurs. La pluie du week-end dernier est très favorable à cette remontée, la surveillance est de mise !

• Des seuils d'intervention sont définis

Des seuils d'intervention pour la septoriose ont été établis sur la base de séries d'essais.

Sur une vingtaine de plantes :

- À partir du stade 2 nœuds, observer la F2 déployée du moment.
- À partir du stade dernière feuille pointante, observer la F3 déployée du moment.

Pour les variétés sensibles (Claudio dans la Région) : si plus de 20 % des feuilles observées présentent des taches de septoriose, réaliser un traitement avant les prochaines pluies.

Pour les variétés peu sensibles (Anvergur, RGT Belalour, Rocaillou, RGT Voilour...) le seuil est de 50 %. *Ce seuil de nuisibilité n'a de sens que dans le cas où la septoriose est la seule maladie foliaire présente. Si des symptômes de rouille jaune apparaissent, il est nécessaire de réaliser une intervention dès les premiers foyers à partir d'épi 1 cm et dès les premières pustules à partir d'un nœud.*

Pour rappel : aucune intervention n'est valable économiquement avant épi 1 cm dans la région, peu importe la pression observée.

En cas de forte pression, sur des blés à partir de 2 nœuds, un premier traitement peut être envisagé (**Figure 1 ci-dessous**). Sur septoriose, il y a des spécialités efficaces à bas prix à base de metconazole. Il est inutile (et coûteux) de sortir l'artillerie lourde

dès maintenant : on garde les spécialités plus complètes pour la dernière feuille étalée.

Il est recommandé toutefois d'associer la triazole utilisée à un multisites, de type soufre (le plus économique) ou Folpel pour limiter le risque de résistance.

J'ai un doute, est-ce vraiment de la septoriose sur mes feuilles ?

Si pycnides visibles = septoriose

Si pas de pycnide visible mettre quelques feuilles 24h dans une bouteille d'eau en plastique vidée de son eau (encore humide) et fermée : au bout de 24h si des pycnides apparaissent = septoriose. Sinon ce n'est pas de la septoriose (tâches physiologiques).


• Puis je mélanger fongicide et herbicide ?

Ça dépend des produits. Pour vérifier si votre mélange est possible réglementairement rendez-vous sur le site <https://melanges.arvalisinstitutdu-vegetal.fr/>

Attention : un mélange peut être AUTORISÉ d'un point de vue réglementaire mais le mélange peut modifier les propriétés physico-chimiques des produits phytosanitaires. Il est donc conseillé de se référer à son distributeur ou aux firmes distributrices pour connaître une éventuelle incompatibilité ou un problème de sélectivité.

Bon à savoir : toutes les spécialités à base de met-sulfuron sont à proscrire en mélange avec les fongicides (risque de phytotoxicité).

Figure 1 : stratégie fongicide sur blé dur



Chambre Régionale d'Occitanie, Mas de Saporta – CS 30012 - 34875 LATTES
Tél : 04.67.20.88.74 Fax : 04.37.30.88.73

Avec le concours de :

- Alpilles Céréales, Arterris, CAPL, Duransia, Ets Magne, Ets Garcin, Coopérative de Fontvieille.
- Ets Perret, Ets Touchat, Ets Perris, Semences de Provence, Actisem, Semences de France, JEEM, SCAD, Vernazobres Frères.
- Chambres d'Agriculture 11, 13, 30, 34.
- BRL, SCP, Lycées agricoles d'Aix Valabre et Nîmes Rodilhan.